

Indication

Grp.no. Medicament

Group 6. Nervous System and Convulsion

(Continued)

Anxiety and states of restlessness	6.2	Medicinal substance:	Hydroxyzine
		Form:	Hydroxyzine tablets / Atarax 25 mg. (USA)
		Effect:	Effective against Anxiety and restlessness Takes effect after 15-30 min..Effective for 4 - 6 hours.
		Dosage:	50-400 mg per day (divided over a few doses). Consult Radio Medical.
		Side-effects:	Drowsiness, sleep, dry mouth, hypotension, dizziness, headache.
		Validity:	5 years
		Storage:	Room temperature (15 - 25 degrees C)
		<i>Remarks</i>	Consult RADIO MEDICAL.Do not use alcohol, sleeping medicine or other medicines that cause drowsiness at the same time
A, B1,B2			

Gruppe 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper

(Continued)

Ængstelser, angstneuroser og rastløshed	6.2	Lægemedelstof:	Hydroxyzine
		Form:	Hydroxyzine tabletter / Atarax 25 mg
		Virkning:	Virksom imod ængstelser, angstneuroser og rastløshed. Virkningen indtræder efter 15 - 30 min. og varer 4 - 6 timer.
		Dosering:	50 - 400 mg daglig (fordelt over flere doseringer). Søg samråd med RADIO MEDICAL.
		Bivirkninger:	Døsighed, søvn, tør mund, lavt blodtryk, svimmelhed, hovedpine.
		Holdbarhed:	5 år
		Opbevaring:	Rumtemperatur (15-25°C)
		<i>Bemærkninger:</i>	Søg samråd med RADIO MEDICAL. Brug ikke alkohol, sovetabletter eller andre lægemidler som samtidig forårsager døsighed.
A, B1,B2			