

## ULYKKE GENERELT

## SPEC. BØRN

## SPEC. ÆLDRE

<p><b>Stands ulykken</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvad er der sket? Hurtigt overblik</li> <li>• Er skadestedet sikkert for behandler og den tilskadekomne</li> <li>• Er den tilskadekomne kontaktbar?</li> <li>• Nødflytning?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inddrag forældrene</li> <li>• Prøv at få god kontakt med barnet</li> <li>• Kan barnet afledes/"købes" med legetøj, slik eller lign?</li> </ul>	<p>Vær opmærksom på nedsat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hørelse</li> <li>• syn</li> <li>• smerteopfattelse</li> </ul>
<p><b>A Airways</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inline-stabilisering: hovedets stilling fastholdes.</li> <li>• Skab frie luftveje</li> <li>• Anlæg halskrave</li> <li>• Giv ilt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Husk barnet har et stort baghoved, derfor polstring under barnets skuldre, for at nakken holdes i en lige linje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protoser kan blokere luftvejene.</li> <li>• Øget risiko for blødning ved anlæggelse af tungeholder.</li> </ul>
<p><b>B Breathing</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedøm vejrtrækningens kvalitet (se-lyt-føl)</li> <li>• Evt. ventilforbinding</li> </ul>	<p>Symptomer på vejrtrækningsproblemer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uro, rastløshed</li> <li>• Sløvhed, ↓ bevidsthed</li> <li>• Mørk, grå, blålig hudfarve</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan have kronisk besværet vejrtrækning.</li> </ul>
<p><b>C Cirkulation</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er der puls? Frekvens og kvalitet?</li> <li>• Undersøg kapillærrespons</li> <li>• Bedøm hudens farve og temperatur</li> <li>• Kontrollér for større blødninger</li> <li>• Evt. venekanyle og drop</li> <li>• Revurdér ABC</li> <li>• Overvej kontakt til Radio Medical</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapillærrespons kontrolleres på læberne, brystkassen eller panden.</li> <li>• Vær især opmærksom på stigende maveomfang.</li> <li>• Børn bliver <u>pludseligt</u> meget dårlige og kan kollapse.</li> <li>• Det er svært/umuligt at lægge venekanyle på små børn.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puls kan være et usikkert vurderingsgrundlag.</li> <li>• Kapillærrespons er ofte forsinket.</li> <li>• Hudens er ofte bleg og kold.</li> <li>• Blødninger kan være svære at standse.</li> </ul>

## ULYKKE GENERELT

## SPEC. BØRN

## SPEC. ÆLDRE

<p><b>D</b> <b>Disability</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vurdér bevidsthedsniveauet</li> <li>• Undersøg pupillernes reaktion på lys</li> <li>• Vurdér om behandlingen kan fortsætte på skadestedet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godt samarbejde med forældrene, for at bedømme barnets bevidsthedsniveau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevidsthed vurderes i forhold til patientens kroniske tilstand.</li> <li>• Inddrag evt. pårørende</li> </ul>
<p><b>E</b> <b>Expose</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evt. top-til-tå undersøgelse på skadestedet</li> <li>• Fiksér i båren</li> <li>• Transportér til sygelukaf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Øget fokus på bughulen (ømhed, misfarvning, bule)</li> <li>• Husk polstring fra skuldre til bækken</li> <li>• Pas på, at barnet ikke får det for varmt eller for koldt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Få præcise oplysninger om aktuelle og tidligere lidelser, evt. fra pårørende.</li> <li>• Kan være mere blufærdige.</li> <li>• Ved fiksering på rygbræt skal der evt. polstres ekstra.</li> </ul>
<p><b>Syge lukaf</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revurdér ABC</li> <li>• Skriv Radio Medical-optegnelse og foretag objektive målinger</li> <li>• Kontakt til Radio Medical</li> <li>• Fortsæt observationer og almindelig 1. hjælp</li> <li>• Udfør RMs ordinationer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug overleveringsblanketten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan have svært ved at strække ben og hofte helt ud, også ekstra polstring her.</li> </ul>

Vejrtrækning		Puls		Blodtryk	
0 - 6 uger	30 - 50	0 - 6 uger	120 - 160	0 - 6 år	74 - 100/ 50 - 68
7 uger - 6 år	20 - 30	7 uger - 1 år	80 - 140	6 - 16 år	104 - 124/ 64 - 80
6 - 13 år	12 - 30	1 - 16 år	60 - 120	Voksne	120 - 140/60 - 90
13 - 16 år	12 - 20	Voksne	60 - 80		
Voksne	12 - 16				