

**Indication**

Persons in risk of radioactive radiation. Normally in a radius of 10 km, from the accident area.	<b>Medicinal substance:</b>	Potassium Iodide
	<b>Form:</b>	Tabl. 65 mg.
	<b>Effect:</b>	Reduces the radiation influence on the thyroid gland in case of radioactive radiation. In order to reduce the cancer risk later.
	<b>Dosage:</b>	Adults >40 years shall not be treated.  Adults <40 and children >12 years: 2 tabl. every second day.  The treatment should be started 24 hours before the expected radioactive radiation and should be continued normally for one week.
	<b>Side-effects:</b>	Passing blush of the skin – occurs seldom and is harmless.  Persons with chronic skin infections, mostly due to allergy to gluten (dermatitis herpetiformis) can get increasing symptoms.
	<b>Validity:</b>	At least 5 years. The tablets can turn yellow. This is without importance.
	<b>Storage:</b>	Dry and in room temperature.
	<i>Remarks</i>	Do only start the treatment by request from the local authorities.  Contact Radio Medical or another competent medical adviser before you start the treatment.  People allergic to Iodide (ex. for treatment of wounds) shall not be treated.

A

Personer der er i risiko for at blive udsat for radioaktiv stråling. Normalt indenfor en radius af 10 km fra ulykkesstedet.	<b>Lægemiddelstof:</b>	Kaliumjodid
	<b>Form:</b>	Tabl. 65 mg
	<b>Virkning:</b>	Nedsætter strålingspåvirkningen af skjoldbruskkirtlen (og dermed kræftisikoen) i tilfælde af radioaktiv bestråling.
	<b>Dosering:</b>	Voksne over 40 skal ikke behandles.  Voksne under 40 år og børn over 12 år 2 tabletter hver anden dag.  Behandlingen påbegyndes 1 døgn før den radioaktive stråling forventes og fortsættes normalt i en uge.
	<b>Bivirkninger:</b>	Forbigående rødme af huden – forekommer sjældent og er ufarligt. Personer med kroniske hudinfektioner oftest som følge af gluten allergi (dermatitis herpetiformis) kan få en opblussen af deres symptomer.
	<b>Holdbarhed:</b>	Mindst 5 år. Tabletterne bliver gradvist mere gullige – dette er uden betydning.
	<b>Opbevaring:</b>	Tørt og ved alm. stuetemperatur
	<i>Bemærkninger:</i>	Behandling iværksættes kun, når der er en opfordring fra lokale myndigheder.  Præparatet bør kun anvendes efter, der er indhentet rådgivning fra Radio Medical eller anden kompetent lægelig instans.  Præparatet må ikke gives til personer, der er overfølsomme for jod (f.eks jod til sårbehandling)

A